일본 STSS 증가에 따른 A형 연쇄상구균 감염 예방수칙 안내

❑ 연쇄상구균 독성쇼크증후군 (STSS) 개요

◀ 연쇄상구균 독성쇼크증후군 개요 ▶

○ **A군 연쇄상구균(GAS)**에 의한 **침습적 감염**으로 인하여 **중증**으로 진행될 경우 나타날 수 있는 질환

○ (임상증상) 초기에 인후통 등 인플루엔자와 유사한 경미한 호흡기 증상을 보이다가 **고열, 발진, 저혈압, 호흡곤란, 괴사성 근막염, 다발성 장기부전 등 중증**으로 진행

○ (감염경로) 주로 점막 또는 상처부위 등을 통하여 **접촉**으로 전파, 비말을 통한 호흡기 전파도 가능

○ (백신 및 치료) 현재까지 개발된 백신은 없으며, 조기진단을 통한 항생제 치료가 중요

❑ A형 연쇄상구균 감염 예방을 위한 수칙

◀ A형 연쇄상구균 감염 예방을 위한 수칙 ▶

○ 기침예절 실천

○ 올바른 손씻기의 생활화

○ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기

○ 의심증상* 발생 시 의료기관을 방문하여 적절한 진료 받기

* 고열, 발진, 심각한 근육통, 상처부위의 발적, 부종 등

○ 상처 부위를 깨끗하게 소독하고 상처부위의 외부 노출을 최소화

○ 수두 및 인플루엔자 백신접종 권고

*인플루엔자 및 수두 감염시 A군 연쇄상구균의 감염 위험성이 증가할 수 있음

(출처) https://www.cdc.gov/groupastrep/igas-infections-investigation.html

문의처 ☏ 390-7175 (보건소 감염병대응팀)